SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO	CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Roden® Bloco	Anticoagulante, Dose única. Contra ratos e camundongos. Usado em áreas internas e externas.	Não é necessário abrir o sachê. Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.	Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre que possível utilizar caixas porta-iscas.	Caixa de 1 kg (50 blocos de 20 g). Caixa despacho com 10 kg. **Validade: 24 meses**
Roden® Grão	Anticoagulante, Dose única. Contra ratos e camundongos. Usado em áreas internas e externas.	Não é necessário abrir o sachê. Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.	Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 1 a 5 sachês em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre que possível utilizar caixas porta-iscas.	Caixa de 1 kg (40 sachês de 25 g). Caixa despacho com 10 kg. **Validade: 24 meses**
Roden® Pellet	Anticoagulante, Dose única. Contra ratos e camundongos. Usado em áreas internas e externas.	Não é necessário abrir o sachê. Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.	Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 1 a 5 sachês em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre que possível utilizar caixas porta-iscas.	Caixa de 1 kg (40 sachês de 25 g). Caixa despacho com 10 kg. **Validade: 24 meses**
Roden® Pó	Anticoagulante, Dose única. Contra ratos e camundongos. Usado em áreas internas e externas.	Contém pigmento fluorescente para a rastreabilidade com luz UV.	Deve ser polvilhado dentro das tocas sobre trilhas e passagens dos roedores alvo, ou em estações porta-pó. Aplicar espalhando cerca de 20 g do pó por ponto.	Frasco de 1 kg. Caixa despacho com 12 kg. **Validade: 24 meses**
Roden® Isca	Anticoagulante, Dose única. Contra ratos e camundongos. Usado em áreas internas e externas.	Pronta ingestão. Não é necessário abrir o sachê. Aroma de Baunilha.	Deve ser colocado nos locais frequentados pelos roedores. Colocar de 1 a 2 sachês em pontos distantes, de 3 a 5 metros ao longo de trilhas e dentro das tocas.	Saco plástico (20 sachês de 10 g). Balde de 2 kg (10 sacos plásticos de 200 g). **Validade: 24 meses**
Roden® Monitor	Monitorar a atividade do roedor. Usado em áreas sensíveis e parte de um programa rotineiro de gerenciamento.	Contém pigmento fluorescente para a rastreabilidade pelas fezes do rato. Não é necessário abrir o sachê. Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.	Deve ser colocado em porta-iscas ou protegidas e fora do alcance de animais não-alvo. Colocar 1 bloco a cada 2 a 3 metros perto de locais de entrada de roedores e em áreas que fornecem abrigo. Inspecionar rotineiramente para a atividade de roedores e substituir iscas estragadas. Caso a isca for consumida, substituir por Roden Bloco Extrusado até que a infestação tenha sido controlada.	Caixa de 1 kg (50 blocos de 20 g). Caixa despacho com 10 kg. **Validade: 24 meses**

PRODUTOS SALMIX
MINICATÁLOGO

SALMIX

PRODUTOS VETERINÁRIOS

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO	CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
HoofCare®	Nos cascos de animais, como bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos.	Ação hidrorrepelente e impermeabilizante com a função de proteger os cascos da umidade e facilitar a higienização.	Aplicação direta no casco com o auxílio de um bastão, ou preparar uma solução de 10% e pulverizar nos cascos dos animais, podendo ser utilizado também nesta concentração no pedilúvio.	Caixas (12 frascos de 1L). Validade: 12 meses.
Luk	Modifica a coloração da pele ferida, em decorrência de uma injúria de qualquer natureza. Previne o canibalismo que é instintivo desses animais. Luk deve ser bem agitado antes de cada aplicação.	Pigmento branco para modificar a coloração da pele ferida. Os frascos possuem válvula spray que permite fácil aplicação. Não causa irritação dérmica.	Aplicação no local específico até que ocorra o desaparecimento da coloração vermelha. Esta aplicação deverá ser realizada em dias alternados.	Caixas (6 frascos com válvula spray de 250ml). Validade: 24 meses.
RedTail®	Para evitar a incidência de caudofagia suína, ocasionada por distúrbios hormonais e estresse. Marca o animal com uma coloração vermelha, que atrai outros animais, porém, causa repulsa pelo gosto amargo.	Reduz as perdas geradas em relação ao bem-estar animal.	Borrifar de 10 jatos do produto na área da cauda do animal.	Frasco branco leitoso (750mL com válvula spray). Validade: 24 meses.
Essensia	Utilizado para manter a temperatura corporal dos recém-nascidos, reduzindo a umidade e contribuindo para a melhor higienização dos animais. Promove a secagem de ambientes - pisos, boxes e a cama - e pode ser usado em contato direto com animais e durante o seu transporte.	Alta capacidade de absorção de umidade. Contém aroma de Eucalipto que acalma os animais.	Polvilhar o produto da seguinte forma: **Perus**: da 2ª a 10ª semana da eclosão dos ovos (2x/semana). 50 g/m²/aplicação. **Frango**: da 2ª a 5ª semana da eclosão dos ovos (2x/semana). Dosagem: 50 g/m² aplicação. **Suínos**: **Matrizes**: na parte posterior do corpo dos animais, 3x/semana ou todos os dias. Dosagem: 3x/semana: 150 g/dia. Todos os dias: 65 g/dia. **Crias em berçário:** diretamente no animal logo após o nascimento e nas esteiras de aquecimento todos os dias.	Sacos (15 kg). Validade: 12 meses
SprayCare® Red	Utilizado em sistemas de vacinação via spray, com o objetivo da preparação de solução aquosa nas condições ideais para a reconstituição da vacina.	Protege e estabiliza a vacina, auxilia na sua administração e monitora o processo de aplicação da vacina via spray. A sua coloração garante após a aplicação um monitoramento do processo de vacinação.	Adicionar um sachê de 12 g em 1L de água, agitar o recipiente para homogeneizar a solução, após 5 min reconstituir a vacina.	Caixas (30 sachês de 12 g). Validade: 24 meses.
SprayCare® Blue	Utilizado em sistemas de vacinação via spray, com o objetivo da preparação de solução aquosa nas condições ideais para a reconstituição da vacina.	Protege e estabiliza a vacina, auxilia na sua administração e monitora o processo de aplicação da vacina via spray. A sua coloração garante após a aplicação um monitoramento do processo de vacinação.	Adicionar um sachê de 50 g em 5L de água ou adicionar um sachê de 12 g em 1L de água. Para ambos, agitar o recipiente para homogeneizar a solução, após 5 min reconstituir a vacina.	Caixas (15 sachês de 50 g). Caixas (30 sachês de 12 g). Validade: 24 meses.

SALMIX

ADITIVOS ENZIMÁTICOS

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Fitase	Nova geração de Fitase termoestável, com excelente resistência contra a alta temperatura durante a peletização, mantendo a sua atividade enzimática.		Redução significativa do teor de fosfato do excremento animal, reduzindo a poluição ambiental.	Aves e Suínos: 50 a 100 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 12 meses.
Xilanase	Em ração animal para hidrolisar 1,4-ß-D-xibolidic em cadeias Arabinoxylana e para eliminar o fator antinutricional dietético.		Melhora da utilização de ingredientes de ração ricos em xilana, mantendo o desempenho animal. Redução da incidência de diarreia.	100 a 200 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 12 meses.
Glucose Oxidase	Para catalisar a oxidação da glicose ao glucono-1, 5-lactona, usando oxigênio molecular e liberando peróxido de hidrogênio.		Suplementada na alimentação animal para reduzir a utilização de antibióticos e óxido de zinco, promovendo a saúde animal.	80 a 100 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 12 meses.

ADITIVOS PIGMENTANTES

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Phaffia Rodhozyme Astaxantina 0,4%	Aditivo tecnológico sensorial pigmentante natural destinado à alimentação animal.		Carotenóide potente antioxidadente, com capacidade 550 vezes superior a da Vitamina E e 10 vezes superior ao ß-Caroteno.	1 a 3 kg/ton de ração.	Baldes (15 kg). Validade: 12 meses.
Cantaxantina 10%	Principalmente em rações animais, em combinação com xanthophylls amarelo, para melhorar a cor amarelo-laranja da gema de ovo. Para pigmentar pele de frango, ovo de mesa e salmonídeos (salmão e truta), Clarias Batrachus, tilápia vermelha, peixe de aquário, caranguejo, etc.		Suplemento Pigmentante que fornece cor idêntica à natureza para ser adicionado nas rações.	25 a 75 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Astaxantina 10%	Maior carotenoide responsável pela pigmentação rosa-vermelha de camarão, lagostas, tilápia vermelha e salmonídeos (salmão, truta de salmão).		Suplemento Pigmentante que fornece cor idêntica à natureza para ser adicionado nas rações.	0,5 a 1 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Apo-Ester 10%	Principalmente em rações completas de aves para melhorar a cor dourada desejável da pele do frango e gema do ovo. Também usado com astaxantina, para colorir a carne do salmão, truta, peixe aquário, etc.		Antioxidante de alta qualidade, tecnologia de estabilização e embalagem a vácuo que garantem sua estabilidade nas rações.	Para coloração da pele: 200-400 g/ton de ração. Para gema de ovo: 25-75 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.

PRODUTOS SALMIX
MINICATÁLOGO

SALMIX

ADITIVOS NUTRICIONAIS

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Up-D 250	Produto contendo o 25-Hidroxicolecalciferol, fonte de vitamina D3, que permite melhor e mais rápida absorção pelos animais.		Fixação mais eficiente e mais rápida do metabólito (25OHD3),o que significa esqueletos mais fortes e animais mais saudáveis e produtivos. Up-D oferece benefícios significativos na produção de aves e suínos, que não podem ser alcançados administrando somente a Vitamina D3.	**FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS E MATRIZES:** 250 g do produto por tonelada de ração. **PERUS E MATRIZES:** 340 g do produto por tonelada de ração. **SUÍNOS**: 180 g do produto por tonelada de ração. Seguir orientação do responsável técnico.	Big Bag (1000 kg). Validade: 12 meses.
Vitamina C 99%	Vitamina essencial para todos os animais, sendo muito eficaz na redução dos efeitos do estresse. Minimiza condições de estresse, como debicagem, vacinação, transporte e em condições de doenças em aves. Em suínos, é usado em dietas pós-desmame, reforço para porcas em lactação e ajuda a melhorar a qualidade do sêmen.		A vitamina C ameniza problemas induzidos pelo estresse térmico, como baixa imunidade, ingestão de ração, ganho de peso, estresse oxidativo, temperatura retal e corporal, qualidade da fertilidade e sêmen, peso da carcaça e mortalidade em aves.	Adicionar de 100 a 200 g/ton de ração.	Sacos (25 kg).
Biotina	Como fonte suplementar de biotina na fabricação de rações.		Necessário para pele e integridade casco. Essencial para o metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas.	Conforme indicação do nutricionista.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Cloreto de Colina 50% Sílica	É a forma comum na qual a colina é adicionada à alimentação. Os níveis de adição variam de acordo com as espécies, mas dependem da idade, composição da alimentação, estresse ambiental e raça.		Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, essencial para inúmeros processos biológicos.	150 a 1400 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Cloreto de Colina 60% Milho	É a forma comum na qual a colina é adicionada à alimentação. Os níveis de adição variam de acordo com as espécies, mas dependem da idade, composição da alimentação, estresse ambiental e raça.		Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, essencial para inúmeros processos biológicos.	50 a 100 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS NUTRICIONAIS (CONT.)

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Cloreto de Colina 75% Liquido	É a forma comum na qual a colina é adicionada à alimentação. Os níveis de adição variam de acordo com as espécies, mas dependem da idade, composição da alimentação, estresse ambiental e raça.		Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, essencial para inúmeros processos biológicos.	50 a 100 g/ton de ração.	IBC (1000 L). Validade: 24 meses.
L-Triptofano 98%	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Além da sua função como nutriente na formação das proteínas corporais, o triptofano está envolvido em vários processos metabólicos.	Adicionar de 0,1 a 1 kg/ton de ração.	Sacos (20 kg). Validade: 24 meses.
L-Valina	Aminoácido indispensável para o desempenho do crescimento.		A L-Valina fornece à indústria de alimentação animal uma ferramenta para alcançar objetivos econômicos, nutricionais e ambientais. Redução de custo. Melhor balanço de aminoácidos (menos resíduos). Menor excreção de nitrogênio para o meio ambiente.	Adicionar de 0,1 a 1 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
DL-Metionina	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Além da sua função como nutriente na formação das proteínas corporais, a Metionina está envolvido em vários processos metabólicos.	Conforme indicação do nutricionista.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Sulfato de Lisina 70%	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Além da sua função como nutriente na formação das proteínas corporais, a Lisina está envolvido em vários processos metabólicos.	1 a 5 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
L-Lisina HCl	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Além da sua função como nutriente na formação das proteínas corporais, a Lisina está envolvido em vários processos metabólicos.	1 a 5 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS NUTRICIONAIS (CONT.)

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Betaina HCl 98%	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Doador de grupo de metila. Efeito antiestresse. Estimulante alimentar em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o acúmulo anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho e qualidade da carcaça.	2 a 3 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Betaina HCl 95%	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Doador de grupo de metila. Efeito antiestresse. Estimulante alimentar em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o acúmulo anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho e qualidade da carcaça.	2 a 3 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Betaina Anidra 96%	Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.		Doador de grupo de metila. Efeito anti-estresse. Estimulante alimentar em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o acúmulo anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho e qualidade da carcaça.	2 a 3 kg/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Fosfato Monocálcico MCP	Como fonte de Fósforo e Cálcio.		Alta solubilidade.	10 a 15 kg/ton de ração.	Sacos (25 e 50 kg). Bag (500 e 1000 kg). Validade: 24 meses.
Fosfato Bicálcico DCP	Como fonte de Fósforo e Cálcio.		Alta solubilidade.	10 a 15 kg/ton de ração.	Sacos (25 e 50 kg). Bag (500 e 1000 kg). Validade: 24 meses.
Fosfato Monobicálcico MDCP	Como fonte de Fósforo e Cálcio.		Alta solubilidade.	10 a 15 kg/ton de ração.	Sacos (25 e 50 kg). Bag (500 e 1000 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS NUTRICIONAIS (CONT.)

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Gali Zn	Atender os requisitos dos animais para crescimento, reprodução, estresse, prevenir doenças e melhorar o desempenho do crescimento e traços reprodutivos.		Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz o dano ao trato digestivo.	300 a 500 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Gali Mn	Atender os requisitos dos animais para crescimento, reprodução, estresse, prevenir doenças e melhorar o desempenho do crescimento e traços reprodutivos.		Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz o dano ao trato digestivo.	70 a 300 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Gali Fe	Para a formação de hemoglobina, aumenta a concentração de ferro no leite da porca e, assim, atende a nutrição de ferro aos leitões.		Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz o dano ao trato digestivo.	200 a 600 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Gali Cu	Atender os requisitos dos animais para crescimento, reprodução, estresse, prevenir doenças e melhorar o desempenho do crescimento e traços reprodutivos.		Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz o dano ao trato digestivo.	50 a 100 g/ton de ração.	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS ACIDIFICANTES

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO	CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Axeed® Liquid	Via água de bebida, para reduzir o pH no trato digestivo superior, a fim de facilitar a digestão e redução da proliferação de microrganismos indesejáveis no estomago e intestino.	Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, utilizado via água de bebida, tendo em sua composição ácidos orgânicos de cdeia curta. Atua no trato digestivo, contra bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, Campylobacter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp.	De 200mL por 1000L de água de bebida.	Caixas (6 ampolas de 200ml). Bombonas com 5L. Validade: 18 meses.
Axeed® Duetto	Via água de bebida, para reduzir o pH no trato digestivo superior, a fim de facilitar a digestão e redução da proliferação de microrganismos indesejáveis no estomago e intestino.	Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, utilizado via água de bebida, tendo em sua composição ácidos orgânicos polares e apolares. Atua no trato digestivo, contra bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, Campylobacter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp.	De 200mL por 1000L de água de bebida.	Caixas (6 ampolas de 200ml). Bombonas com 5L. Validade: 18 meses.
pHCare®	Para sistemas de água de bebida de animais de produção onde o pH é alcalino.	Apresentado em pastilhas de 100 g, utilizado via oral, devendo ser sempre adicionado à água.	Iniciar com 1 pastilha de 100 g no dosador de cloro e aumentar progressivamente o número de pastilhas. Caso seja necessário, até que seja regulado o pH da água de bebida entre 6,5 a 7,0, segundo a orientação do veterinário responsável. A aplicação deve ser feita direto nos dosadores de cloro com às pastilhas de cloração.	Caixas (12 kg): 20 sachês com 6 pastilhas de 100 g cada). Validade: 24 meses.
Axeed® Feed	Na formulação de rações de aves e suínos de produção.	Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, tendo em sua composição ácidos orgânicos polares, protegidos por óleo vegetal em um veículo mineral. Atua no trato digestivo, contra bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, Campilobacter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp. Reduz o pH e promove melhora significativa na qualidade da ração e aumento da digestibilidade, o que otimiza o desempenho dos animais e aumenta a produtividade e sustentabilidade do seu negócio.	De 2 a 4 kg por tonelada de ração.	Sacos (10 kg) e Big Bags (300 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS ACIDIFICANTES (CONT.)

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO	CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Axeed® Feed C810	Na formulação de rações de aves e suínos de produção.	Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, tendo em sua composição ácidos orgânicos polares, protegidos por ácidos orgânicos apolares em um veículo mineral. Atua no trato digestivo, contra bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, Campilobacter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp. Reduz o pH e promove melhora significativa na qualidade da ração e aumento da digestibilidade, o que otimiza o desempenho dos animais e aumenta a produtividade e sustentabilidade do seu negócio.	De 2 a 4 kg por tonelada de ração.	Sacos (10 kg). Validade: 24 meses.
Axeed® Buty 500	Para produtos destinados à alimentação animal.	Ácido Butirico protegido.	Mistura em alimentos completos - rações Espécies Inclusão (kg/kg ração) Leitões (0.5-1.2), Suínos em crescimento (0.3-0.5) Matrizes – suínos (0.5-1.0) Aves de postura, de corte e matrizes (0.2-0.4) Outras espécies animais (1.0-2.0)	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.
Axeed® Buty E 400	Para produtos destinados à alimentação animal.	Ácido Butirico e Oleos Essenciais protegidos.	Mistura em alimentos completos - rações Espécies Inclusão (kg/kg ração) Leitões pré-desmame (0.6-1.2) Leitões pós-desmame (0.5-1.0) Suínos em crescimento (0.3-0.5) Matrizes e reprodutores– suínos (0.5-1.0) Pintinhos (0.3-0.5) Frangos de corte – crescimento (0.1-0.3) Aves em postura (0.1-0.2)	Sacos (25 kg). Validade: 24 meses.

PRODUTOS SALMIX
MINICATÁLOGO

SALMIX

ADITIVOS CONSERVANTES

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Nubila	Utilizados nos silos, caminhões, nas fábricas de rações e galpões.		Pó fino com excelente aderência à superfície. Gerador de monômeros de vapor do Ácido Propiônico.	Utilizar Nubila com atomizadores/pulverizadores em silos, caminhões, fábrica de rações e galpões, nas seguintes quantidades: a) Silos com capacidade para 20 toneladas: 1,5 a 4 kg / b) Caminhões: 1 kg/m. / c) Misturadores: 1,5 kg/10m. / d) Galpões: 2,5 a 5,0 g/m. / e) Tratamento de choque em ingredientes e rações: 2,5 kg/ton.	Sacos (20 kg). Validade: 24 meses.
Axeed® Mould	Em fabricação de rações, durante a mistura de Ingredientes. Uso exclusivo para fabricantes de produtos destinados à alimentação animal.		Gerador de monômeros de vapor do Ácido Propiônico	Adicionar 1 a 2 kg por ton. de ração.	Sacos (10 kg). Validade: 24 meses.
ProteFeed®	Na fabricação de rações.		Contém Mono, Di e Triglicerideos do Ácido Propiônico, tensoativo que permite a maior penetração do produto na ração solida.	Adicionar de 0,3 a 5L por ton. de ração.	IBC (1000L). Validade: 24 meses.
Profor	Em fabricação de rações, durante a mistura de ingredientes. Uso exclusivo para fabricantes de produtos destinados à alimentação animal.		Substitui a quantidade de Cálcio a ser adicionada à ração, reduzindo a alcalinica pela utilização de Carbonato.	Adicionar 1 a 2 kg por ton. de ração.	Sacos (20 kg). Validade: 24 meses.

ADITIVOS REGULADORES DE ACIDEZ

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Ácido Fumárico	Tecnológico para produtos destinado à alimentação animal.		O Ácido Fumarico sendo um ácido dicarboxilico tem 2 hidrogenios com pk=3,03 e pK=4,44, os quais auxiliam na redução de variações de pH no intestino.	De 1 a 5 kg por tonelada de ração.	Sacos (25 kg). Válidade: 24 meses.

PRODUTOS SALMIX
MINICATÁLOGO

SALMIX

SUPLEMENTOS

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Fervita®	Para aves e suínos durante os primeiros 7 dias de alojamento. No caso de recebimento de pintinhos, deve ser iniciada no primeiro dia de vida.		Vitaminas soluveis e dispersiveis na forma de pastilha efervescente	Via água de bebida nas seguintes quantidades: **FRANGOS DE CORTE E POEDEIRAS:** 1 a 2 pastilhas de 15 g em 100L de água ou 1 a 2 pastilhas de 150 g em 1000L de água. **MATRIZES:** 1 a 3 pastilhas de 15 g em 100L de água ou 1 a 3 pastilhas de 150 g em 1000L de água. **SUÍNOS:** 1 a 2 pastilhas de 15 g em 100L de água ou 1 a 2 pastilhas de 150 g em 1000L de água.	Baldes (80 pastilhas de 15 g ou 35 pastilhas de 150 g. Validade: 12 meses.
Axeed® Red Carpet Gel	Para aves na forma de Gelatina Hidratante utilizada no transporte de pintinhos.		Gelatina pronta para ser utilizada em caixas de transportes de pintinhos de 1 dia.	Abrir a embalagem e dependendo da distância a ser percorrida aplicar da seguinte forma: até 200Km = 100 g (1/6 da gelatina). 201 a 500Km = 200 g (1/3 da gelatina). > 500Km = 300 g (1/2 da gelatina).	Caixas (5 bandejas termoformatadas com 600 g de gelatina/ bandeja). Validade: 3 meses.
Elektra®	Para correção dos valores de Sódio [Na+], Potássio [K+] e Cloreto [Cl-] em dietas de aves e suínos.		Suplemento Mineral Eletrolítico, sendo pó solúvel em água.	**AVES E SUÍNOS:** Diluir 2 a 4 sachês em 1000L de água. O fornecimento deve ser feito após completa dissolução do produto, durante um período de 3 a 7 dias. Consumo diário estimado de água de bebida suplementada por espécie e categoria animal indicada: **FRANGOS DE CORTE:** 3 a 5mL água/pintinho (equivale a 1,5 a 5mg do produto). **SUÍNOS:** 2L água/leitão (equivale a 1 a 2 g do produto).	Baldes (40 sachês de 250 g individualmente embalados). Validade: 12 meses.
Picta®	Foco na suplementação vitamínica deste mineral, em uma dieta em que rações possuem teor de cálcio reduzido. Para isso, compõe-se de vitaminas auxiliares que aumentam a absorção de cálcio no organismo.		Pastilha efervescente contendo Cálcio na forma de sais solúveis de Ascorbato, Citrato e Fumarato. Com utilização via água de bebida, facilita a administração em animais de idades médias, podendo ser utilizada por aves e suínos, melhorando seu balanço nutricional.	**FRANGOS DE CORTE E PERUS:** 02 a 04 pastilhas de 150 g do produto em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a completa dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por 1 dia, 1x/semana. **POEDEIRAS:** 02 a 04 pastilhas de 150 g do produto em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a completa dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por um mínimo de 4 dias consecutivos. Não ultrapassar a quantidade máxima de 04 pastilhas em 1000L de água. **SUÍNOS:** 05 pastilhas de 150 g do produto em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a completa dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por 1 dia, 1x/semana. Não ultrapassar a quantidade de 05 pastilhas.	Baldes (35 pastilhas de 150 g individualmente embalados). Validade: 12 meses.

SUPLEMENTOS (CONT.)

PRODUTO	INDICAÇÃO DE USO		CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS	DOSE E APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Lucciola	Para pintinhos.		Gelatina na forma de pó para ser preparada no incubatório contendo energético, eletrólito, vitaminas e açucares.	1 sachê (125 g) em 5L de água quente a 80ºC em um recipiente com agitação. Agitar 5 min e colocar nas formas apropriadas, deixar que esfrie a temperatura ambiente. Se solidificará na forma de gelatinas retangulares contendo cada bloco 100ml. Fornecer a gelatina nas caixas de transportes para pintinhos de 01 dia (caixas com 100 pintinhos). Consumo diário estimado: 100mL (1 bloco de gelatina) a 200mL (2 blocos de gelatina)/100 pintinhos (1 caixa).	Caixas (50 sachês de 120 g individualmente embalados). Validade: 12 meses.
Namblu®	Como fonte de energia (triglicerídeos de cadeia média) para leitões recém-nascidos.		Mistura de óleos contendo triglicerídeos de cadeia média (TCM), utilizado na suplementação de leitões recém-nascidos, os quais apresentam uma redução na excreção de nitrogênio e degradação do glicogênio do fígado. Essas observações indicam que eles utilizam TCM como fonte de energia em vez das reservas de glicogênio e proteínas. Os ácidos graxos de Cadeia Média (TCM) são absorvidos mais ligeiramente no intestino e são oxidados rapidamente no fígado, quando comparados com os ácidos graxos de cadeia longa, encontrados em alguns óleos vegetais e na gordura animal.	De 2 a 4mL em uma única vez, entre 6 e 12 horas de nascimento. Uma segunda porção de 2 a 4mL pode ser fornecida dentro de 24 a 48 horas quando necessário.	Caixas (12 frascos de 1L). Validade: 12 meses.
Amina	Para diluir em água de bebida de aves e suínos.		Aminoácidos solúveis e dispersíveis na forma de pastilha efervescente.	**AVES E SUÍNOS:** 1 a 2 pastilhas em 1000L de água para lotes de até 10.000 animais. Consumo diário estimado: **FRANGOS DE CORTE:** 3 a 5mL água/pintinho. **MATRIZES**: 290mL água/ave. **SUÍNOS**: 2L/leitão.	Baldes (35 pastilhas de 150 g individualmente embalados). Validade: 12 meses.
Up-D WD	Produto contendo o 25-Hidroxicolecalciferol fonte de vitamina D3, que permite melhor e mais rápida absorção pelos animais.		Fixação mais eficiente e mais rápida do metabólito (25OHD3),o que significa esqueletos mais fortes e animais mais saudáveis e produtivos. Up-D oferece benefícios significativos na produção de aves e suínos, que não podem ser alcançados administrando somente a Vitamina D3.	**FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS E MATRIZES:** 250 g do produto por 1000L. Perus e matrizes: 500 g do produto por 1000L. Seguir orientação do responsável técnico.	Saches (250 g). Validade: 12 meses.
GlyCow	Em Vacas Leiteiras de 48 a 72 horas antes e logo após a parição, quando os animais têm alta demanda de energia, causada pelo aumento na produção láctea		Utilizado como fonte de energia prontamente disponível com valor calórico de 4 cal/g.	1 ampola (300 ml)/animal.	Caixa (6 ampolas de 300ml). Validade: 24 meses.